



DIAGNÓSTICOS

Instrucciones

Test de Estimulación con TRH

IN-LAB-11
Edición: 00
Vigencia: 09/03/2026
Pág. 1 / 1

ADVERTENCIA:

Este análisis requiere de una muestra de buena calidad. Lea atentamente todas las indicaciones

Requisitos previos

- La administración endovenosa del medicamento; TRH, deberá ser realizado por un profesional médico o personal de enfermería. El Laboratorio no realiza este procedimiento.
- Evitar administración de radioisótopos.
- Permanecer en posición supina (acostado boca arriba) durante la prueba.

Adultos

- Ayuno de 8 horas.
- No fumar, comer ni masticar chicle durante la prueba.
- Ocasionalmente pueden presentarse náuseas, vómitos, sensación imperiosa de micción y enrojecimiento facial.

Niños

- Ayuno de 4 horas.
- No comer ni masticar chicle durante la prueba.
- Ocasionalmente pueden presentarse náuseas, vómitos, sensación imperiosa de micción y enrojecimiento facial.

Toma de muestra

- En ayunas, en el laboratorio, le tomarán una primera muestra de sangre (Tiempo cero).
- Luego, le será administrado el TRH, en el servicio de salud de su preferencia, anotar la hora. Regresar al laboratorio.
- Posteriormente le tomarán la (s) muestra(s) de sangre correspondientes (15 y 30 minutos) después de la administración de TRH, o según lo solicitado por su médico.